

Balon wewnętrzżołądkowy

Alternatywna dla klasycznej operacji bariatrycznej. Zabieg jest endoskopowy, odwracalny i bezpieczny. Trwa 20-30 minut i polega na umieszczeniu w żołądku balonu silikonowego wypełnionego solą fizjologiczną oraz błękitem metylenowym. Ta metoda ogranicza ilość pokarmu oraz sprawia uczucie sytości. Balon pozostawiony jest w żołądku około 6 miesięcy. Po zabiegu można odczuwać nudności, wzdęcia oraz biegunki. Balon wewnętrzżołądkowy pełni rolę pomostu do zabiegów bariatrycznych i redukcji masy ciała przed planowanymi rozległymi operacjami np. przepukliny pooperacyjne.

Przebieg operacji

1. Zabieg przeprowadza się pod kontrolą wziernika żołądkowego, który wprowadzany jest przez usta w celu obejrzenia wnętrza żołądka, a następnie obserwacji napełnienia balonu.
2. Balon do żołądka wprowadzany jest pusty, a następnie przez wąską rurkę przyłączoną do balonu wypełniany sterylnym roztworem soli fizjologicznej.
3. Po napełnieniu balonu do odpowiedniej pojemności (od 400ml do 700ml) rurka jest odłączana od balonu poprzez jej pociągnięcie. Balon w miejscu przyłączenia rurki ma zastawkę, która zamyka się po odłączeniu rurki.
4. Od momentu usunięcia rurki balon swobodnie przemieszcza się w żołądku. Na końcu zabiegu usuwany jest endoskop.

Usunięcie balonu

Za pomocą specjalnych narzędzi wprowadzanych przez wziernik żołądkowy – przebija się balon i odciąga się z jego wnętrza płyn fizjologiczny. Następnie pusty balon chwyta się specjalnymi szczypcami i usuwa przez usta.